

포아백PRRS생백신(65*240mm) 설명서

앞

뒤

국가출하승인검정면제
동물용의약품



POAVAC PRRS

포아백 PRRS 생백신

돼지 생식기호흡기 증후군 생백신

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus, attenuated live vaccine

[원료 및 분량] (본제 1두분)

가. 동결건조 과

- 돼지 생식기호흡기 증후군바이러스 (LMY-BP chimera주)
-----10^{3.8}TCID₅₀ 이상
- 면역보조물질
HSP70 ----- 10μg
HSPX ----- 10μg
- TPGG동결건조 보존제 (부기1) ----- 20%

나. 멸균 희석액 (부기2)

- 근육 접종 시 ----- 2mL
피내 접종 시 ----- 0.5mL

[제형 및 성상]

가. 제형: 생물학적 제제

나. 성상: 유백색의 건조괴로 희석액으로 희석하였을 때 쉽게 녹으며, 이물 및 이취가 없음

[효능 및 효과]

북미형 돼지 생식기 호흡기 증후군 바이러스에 의한 임상적인 증상의 경감목적으로 사용한다.

[용법 및 용량]

동결건조 생독백신을 멸균 희석액과 혼합하여 잘 흔들어서준다.

가. 접종시기: 3~5주령 자돈

나. 접종방법

근육접종 방법과 피내접종 방법 중 선택하여 접종한다.

(1) 근육접종

동결건조 생독백신을 멸균 희석액으로 아래와 같이 용해한 후 1두당 이근부에 2mL 주사

제품포장단위	멸균 희석액 용량
10두분	20mL
50두분	100mL
100두분	200mL

(2) 피내접종

동결건조 생독백신을 멸균 희석액으로 아래와 같이 용해한 후 피내에 0.5mL 주사

제품포장단위	멸균 희석액 용량
10두분	5mL
50두분	25mL
100두분	50mL

[주의사항]

가. 다음 돼지에게는 투여하지 말 것

- 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 돼지에게는 사용하지 마십시오.
- 열이 있거나 영양장애가 심한 돼지, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 돼지, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 돼지에는 사용하지 마십시오.
- 임신돈이나 중부령의 웅돈에는 사용하지 마십시오.
- 돼지 생식기 호흡기 증후군 바이러스 항체 음성으로 유지하려는 돈군에는 사용하지 마십시오.

나. 일반적 주의

- PRRS 백신은 돈군의 현재 감염 바이러스의 균주, 전파 상태, 발병력 및 면역수준에 따라 효능이 달라질 수 있으므로 이를 고려하여 백신접종 여부를 결정하십시오.
- 돼지 생식기 호흡기 증후군 바이러스 항체 음성을 유지하려는 돈군에는 백신을 접종한 돼지를 합사시키지 마십시오.

다. 적용상의 주의

- 희석액으로 용해 후 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- 사용 전에 백신 전체가 실온(22~27°C)이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 1두 1침의 원칙으로 사용하십시오.
- 주사방법이 잘못되면 동통, 경결 및 화농이 생길 수 있습니다.
- 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사부위를 70%알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
- 각종 스트레스 요인 (환경변화, 사료변경, 수술 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것을 권장합니다. 최소한 접종 1주일 전후에는 모든 스트레스 요인을 피하는 것을 권장합니다.
- 도축 21일 전부터는 백신을 접종하지 마시기 바랍니다.
- 피내 접종 시 피내주사기 또는 적절한 기기를 이용하시기 바랍니다.

라. 저장상의 주의

- 용해 후 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.
- 안전사고 방지를 위해 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
- 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 개봉한 백신은 전량 사용하고 사용 후 남은 백신과 빈 용기는 소각하는 등 안전하게 폐기 하십시오.

마. 기타 주의사항

- 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 접종시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종 장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 ㈜바이오포아로 연락하여 주시기 바랍니다.

[포장단위] 10두/병, 50두/병, 100두/병

- 가. 10두분: 10두분 동결건조 생독백신 1병 및 멸균 희석액(근육접종: 20mL, 피내접종: 5mL)
나. 50두분: 50두분 동결건조 생독백신 1병 및 멸균 희석액(근육접종: 100mL, 피내접종: 25mL)
다. 100두분: 100두분 동결건조 생독백신 1병 및 멸균 희석액(근육접종: 200mL, 피내접종: 50mL)

[유효기간 및 저장방법]

- 가. 저장방법: 직사광선을 피하고 냉장온도 (2~8°C)에 보관
나. 유효기간: 제조일로부터 24개월

제조사

㈜바이오포아

경기도 화성시 동탄기흥로 593-26

Tel. 031-375-8304 / www.biopoa.co.kr